

病名 () 症状 (股関節の痛み) 患者番号： 患者氏名： 様

月日	/	/	/	/	/	/	
経過 (病日等)	入院日～手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日	手術後2～3日	手術後4～13日	手術後14日～20日
達成目標	#手術可否判定 #手術日決定 #手術に対し、理解ができ不安が表出できる		#疼痛が軽減できる #安楽に過ごす事ができる	#疼痛が軽減される #リハビリができる	#疼痛が軽減される #リハビリができる #車椅子へ乗車し 離床ができる	#疼痛が軽減される #リハビリができる #立位・歩行訓練ができる	【退院目標】 #車椅子移乗可能
治療 ・ 薬剤 (点滴・内服)	現在服用しているお薬を確認させていただきます 入院中、内服薬は原則としてご報告頂いた内容に基づき、病院から用意いたします。 手術前夜は、処方された薬を指示通りに内服してください	医師の指示で内服薬を服用してもらうことがあります 術衣の更衣し、点滴を始めます	術後点滴を行います	抗生剤の点滴をします			必要なら退院薬をお渡します
処置	血栓予防の包帯を巻きます		手術後酸素・心電図モニターを装着します 尿の管・創部に管が入ってくる場合があります	朝までには酸素・心電図モニターを外します 相談により尿の管を抜きます	創の消毒を行います (創部に管が入っている際抜きます)	12-14日目に抜糸します	
検査				採血 レントゲンを行います		適宜レントゲンと採血を行います	
活動・安静度	ベット上安静です			病状に依りて、車椅子走行可能です			
リハビリ	手術日まではベッドの上でリハビリを行います			車椅子に乗れば訓練室でリハビリを行います			
食事	食事制限はありません アルジネードウォーターがでます	手術日は絶食です アルジネードウォーターがでます		食事制限はありません			
清潔	体を拭きます			体を拭きます	創を保護するテープを貼ったらシャワー可能です		
排泄	ベッド上でトイレを処理します			車椅子でトイレへいけます			
患者さま及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	治療方針、手術法について説明します		手術終了後に主治医より手術について説明があります	適宜術後経過の説明を行います 転院先病院受診後、転院の日取りを決定します			退院後の服薬がある方は薬剤師が服薬指導に伺います 転院に際しての注意事項等を説明します
退院に向けて (在宅復帰支援計画) 相談	退院に向けてお困りごとや不安なことがありましたら病棟担当相談員、又は担当看護師にご相談下さい				退院後の「治療計画」 ・次回受診 ()		
その他 (看護計画など)	安全・安楽に検査・治療が受けられるようサポートしてまいります				退院後の「療養上の問題点」 ・		